MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Liberté Égalité Fraternité

Académie : VERSAILLES (Ecole MERCIER SAINT-PAUL)
Département : 78 - YVELINES

SP²A Société pédiatrique de pneumologie & allergologie

3 - CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE - PARTIE MEDECIN TRAITANT ou à préciser :

Fiche standard et fiches élaborées avec les sociétés savantes pour les pathologies les plus fréquentes sont disponibles sur Eduscol

Fiche spécifique N° 01

Nom / Prénom :	**Date de naissance** :
Numéros d'urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 :	
Fiche établie pour la période suivante :	

Dès les premiers signes**, faire chercher la trousse d'urgence** de l'enfant ainsi qu'un **téléphone portable.**

Ne pas quitter l'enfant.

Evaluer la situation et pratiquer :

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
☐ Toux sèche ☐ Gêne respiratoire ☐ Essoufflement ☐ Respiration sifflante ☐ Pâleur ☐ Autre :	⇒ Asseoir l'enfant au calme, le/la rassurer, noter l'heure ⇒ Garder l'enfant sous la surveillance d'un adulte en position assise, au calme.	☐ Faire inhaler _____ bouffées de _____ ☐ Dans la chambre d'inhalation La procédure est la suivante : (*cf. QR code ci- contre*) - Dans tous les cas, secouer le spray - Si utilisation d'une chambre d'inhalation, placer le spray dans la chambre. - Placerle masque/embout buccal sur le visage - Appuyer UNE fois sur le spray et laisser respirer l'enfant calmement 5 fois - Recommencer autant de fois que noté ☐ Autre :
Si dans les _____ minutes suivantes il n'y a pas d'amélioration et en l'absence de signes de gravité		☐ Refaire inhaler _____bouffées de_____toutes les __ minutes pendant _____ ☐ Dans la chambre d'inhalation (chaque bouffée suivie de 5 respirations) ☐ Autre :

Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou 112.

Signes de gravité	Mesures à prendre	Traitement
☐ Sans amélioration dans Les _____ minutes ☐ Si apparition de signes de gravité (Assis et penché en avant a du mal à parler et à tousser / sueurs / agitation / trouble de la conscience / pauses respiratoires / …)	⇒ APPELER le **SAMU (15 ou 112)** et suivre les consignes données ⇒ Garder l'enfant sous la surveillance d'un adulte en position assise, au calme.	☐ Continuer à faire inhaler _____ bouffées de _____ toutes les _____ minutes jusqu'à l'arrivée des secours ☐ Dans la chambre d'inhalation (chaque bouffée suivie de 5 respirations) ☐ Traitement complémentaire par :

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informée.

Les éléments médicaux complémentaires utiles sont transmis au médecin de l'EN par la fiche de liaison disponible en ligne. Un courrier médical à l'attention des services de secours peut également être joint sous pli cacheté. Courrier et/ou fiche de liaison joints : **OUI** **NON**

Cachet du médecin : Date : Signature du médecin :

© Direction générale de l'enseignement scolaire-MCT